

Hydromorphologische Seeuferkartierung im GEK Rhin 1 + 2

Möllensee bei Krangen

Schematische Banddarstellung der hydromorphologischen Beeinträchtigung der Seeuferzone.
Uferparallele Zonierung in 100 m-Abschnitten entlang einer generalisierten Uferlinie. Ufervertikale Zonierung in Sublitoral, Eulitoral und Epilitoral. Die dargestellte Breite dieser Ufersubzonen ist schematisch und entspricht nicht ihrer tatsächlichen Ausdehnung.

Legende

Beeinträchtigungsindex

- 1,00 - 1,50 naturnah, unverändert
- 1,51 - 2,00 sehr gering verändert
- 2,01 - 2,50 gering verändert
- 2,51 - 3,00 deutlich verändert
- 3,01 - 3,50 stark verändert
- 3,51 - 4,00 sehr stark verändert
- 4,01 - 4,50 übermäßig verändert
- 4,51 - 5,00 technisch, lebensfeindlich

Stand:	31.07.2011
Maßstab:	1:15.000
Bezugssystem:	ETRS 1989 UTM Zone33N
Bearbeiter:	ecoconcept + pictures - EcoDataDesign im Planungsteam GEK 2015 ube - Lp+b - IPS

ecoconcept+pictures

EcoDataDesign
Büro für Ökologie und Datenmanagement

0 100 200 400 600 800 1.000 Meter